

Lithuanian (LT)

Indikacija ir numatyta pacienčių grupė

„Bulkamid® Hydrogel“ skirtas naudoti kaip šlaplės tūrio didinimo medžiaga moterų šlapimo nelaikymui gydyti, kai reikšmingą įtaką daro streso komponentas. „Bulkamid® Hydrogel“ skirtas suaugusioms pacientėms (vyresnėms nei 18 metų).

Kontraindikacijos

„Bulkamid® Hydrogel“ negalima naudoti pacientėms, kurios serga ūmine šlapimo pūslės ar šlapimo takų (šlaplės) infekcija arba kurių šlaplės audiniai pažeisti. Pacientėms, kurioms lytinių organų srityje yra aktyvi pūslelinė, „Bulkamid® Hydrogel“ švirkšti negalima.

Įspėjimai arba atsargumo priemonės

Specialių atsargumo priemonių ar įspėjimų, susijusių su „Bulkamid®“ injekcijomis, jums kaip pacientei nėra. Prieš procedūrą gydytojas jums papasakos apie gydymą ir praneš, ar reikia imtis atsargumo priemonių, pvz., jeigu procedūra bus atliekama taikant bendrąją anesteziją.

Ateityje turėtumėte informuoti sveikatos priežiūros specialistus, kad buvote gydyta „Bulkamid® Hydrogel“. Jei po gydymo „Bulkamid® Hydrogel“ jums reikėtų atlikti operaciją ar didesnius dantų gydymo darbus, gydytojas turi apsvarstyti gydymą antibiotikais, kad sumažintų infekcijos riziką. Be to, yra rizika, kad ateityje tyrimų metu implantas gali atrodyti kaip liga.

Rizika ir įspėjimai

Jei manote, kad pasireiškė šalutinis poveikis, susijęs su „Bulkamid® Hydrogel“ ar jo naudojimu, arba jei nerimaujate dėl rizikos, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Šis dokumentas nepakeičia sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos, jei jos reikia. Kaip ir atliekant bet kokią procedūrą, yra infekcijos rizika, todėl prieš procedūrą rekomenduojama vartoti antibiotikų. Prieš procedūrą gydytojas jums papasakos apie numatytą naudojimą, laukiamus rezultatus, kontraindikacijas, atsargumo priemones, įspėjimus ir galimą šalutinį poveikį.

Gali kilti komplikacijų. Tai gali būti laikinas skausmas procedūros metu ir (arba) netrukus po jos (čia padės vietinė anestezija), nedidelis kraujo kiekis šlapime, uždelstas šlapinimasis, skausmingas šlapinimasis ir (arba) šlapimo takų infekcija. Šios komplikacijos yra laikinos ir paprastai išnyksta per kelias dienas. Retais atvejais pacientėms gali būti sunku pasišlapinti (šlapimo susilaikymas) ir gali tekti naudoti vienkartinį kateterį šlapimo pūslei ištuštinti. Paprastai tai praeina per 24 valandas. Gali pasireikšti skubos šlapimo

nelaikymas, t. y. staigus ir intensyvus poreikis šlapintis. Labai retais atvejais ($< 1/10\,000$ švirkštų) dėl infekcijos gali susidaryti infekcinis mazgelis (abscesas) (kuris gydomas antibakteriniu preparatu).